شروعی امیدوارکننده برای پسته

حسین رضایی تاج آبادی
کارشناس ارشد باغبانی



سال گذشته پس از پایان ماه‌های آذر و دی نگرانی‌ها خیلی زیاد بود، چون حتی نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن، کمترین میزان تجمیع ساعات سرمایی تجربه شده‌بود. می‌توان گفت تقریباً از بهمن ماه شرایط جوی خوب شد و ماه‌های بهمن و اسفند سهم زیادی در تأمین نیاز سرمایی داشتند. اما نیاز سرمایی تأمین شده نسبت به میانگین سال‌های گذشته کمتر بود و همین موضوع باعث تأخیر در رشد اول فصل درختان پسته شد، به‌طوری‌که نسبت به فروردین سال قبل، درختان ۱۲ تا ۱۴ روز دیرتر سبز شدند. همین مسئله موجب فعالیت دیرتر آفات و متعاقباً به تعویق افتادن سم‌پاشی‌های اول فصل شده‌است. خوشبختانه خطر سرمازدگی به دلیل رطوبت ناشی از بارندگی‌های فروردین در کل کشور وجود نداشته‌است. در گذشته خسارات سرمازدگی بیشتر در روزهای مختلف فروردین از ششم تا بیست و پنجم اتفاق می‌افتاده‌است، اما از آنجایی که طی ۲ سال گذشته عمدتاً گرماها خسارت زده‌اند، توجه ما هم به دماهای حداکثر بوده است، خوشبختانه امسال این خطر نیز کمتر پسته کشور را تهدید می‌کند. ممکن است بارندگی‌ها در باغ‌هایی که درخت نر کمی دارند اثر منفی بر تلقیح داشته‌باشد، اما این احتمال ضعیف است، چون بلافاصله بعد از بارندگی‌ها هوا آفتابی می‌شد و پراکنش دانه گرده به خوبی انجام گرفته‌است.

وضعیت ارقام هم تاکنون خوب است. با اینکه رقم کله قوچی جوانه گل کمی آورده است، اما درختان به خوبی سبز شده‌اند و همان تعداد خوشه کمی که دارند به خوبی کشیده و باز شده‌است. معمولاً حساس‌ترین ارقام به نوسانات دمایی و تأمین نیاز سرمایی رقم کله قوچی و اکبری هستند. وقتی کله‌قوچی به این خوبی سبز شده، می‌توان پیش‌بینی کرد که رقم احمدآقایی و بقیه ارقام هم وضعیت خوبی داشته‌باشند. به‌طورکلی، تا امروز در جاهایی که تلقیح تمام شده و دانه‌ها ارزنو شده‌اند، دانه‌ها هماهنگ هستند و مشکل خاصی مشاهده نمی‌شود. فقط باغداران در جاهایی که محصول کم است باید مراقب باشند تا آفت محصولشان را نابود نکند و از آنجایی که تا آخر اردیبهشت ممکن است تعداد روزهای ابری زیاد باشد و در جذب کلسیم مشکل ایجاد شود، محلولپاشی کلسیم و مصرف خاکی آن را در برنامه تغذیه درختان پسته قرار دهند و حتی مقدار مصرف را به اندازه ۲ برابر سال گذشته در نظر بگیرند تا مشکل ختلال در جذب کلسیم مرتفع گردد.

برای توضیح در خصوص خسارت‌های احتمالی باید از نیمه اردیبهشت ماه به بعد که کلیه ارقام مرحله ارزنو را پشت سرگذاشته‌اند، قضاوت کرد. برای تخمین مقدار محصول امسال در اواخر تیرماه می‌توان اظهار نظر نمود، چون وضعیت پوکی در آن زمان مشخص می‌شود.